

Informationen zur Behandlung mit Tofacitinib

(z.B. Xeljanz®)

(Frauen: Vor Therapiebeginn Schwangerschaft ausschliessen bzw. 6-monatige Pause vor geplanter Schwangerschaft)

1. Dosierung:

5 mg 2 x täglich per os (Steigerung auf 2 x 10 mg in Absprache mit dem Rheumatologen möglich)

2. Mögliche unerwünschte Wirkungen:

1. Diarrhö, Dys-/Hyperlipidämie, Dyspepsie, Übelkeit, Gastritis, Transaminasenanstieg, Magen-Darm Perforation, Übelkeit, Unterbauchschmerzen
2. Leukopenie, Anämie
3. CK-Anstieg, Muskelschmerzen, Pharyngitis, Gewichtszunahme, Ödeme
4. Hypertonie
5. Nierenfunktionsstörungen
6. Kopfschmerz, Insomnie
7. Haarausfall, Exantheme
8. Infekte

3. Wechselwirkungen

Sind möglich mit Medikamente die über das Enzym CYP3A4 verstoffwechselt werden:

Hemmung => Tofacitinib-Exposition erhöht	Induktion => Verlust oder Verringerung des klinischen Ansprechens
Ketoconazol, Fluconazol, Cyclosporin	Rifampin

4. Erforderliche Kontrolluntersuchungen:

- Woche 0 und 4: Rotes Blutbild, Leukozyten mit Differentialblutbild, Thrombozyten, Kreatinin, ALT, AP, γ GT, Bilirubin
- Woche 6 einmalig Cholesterin, HDL, LDL, Triglyzeride
- ab der 8. Woche: alle 12 Wochen

Bei Fragen bitte jederzeit telefonische Rücksprache